


រូបផែនក្រោមនេះបានបង្ហាញពីភាពជាបន្ទាន់ស្ថិតនៅលើទីតាំងដែលបានបង្ហាញ។





โรงพยาบาลเสิงสาง

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน**  
**ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

.....  
 น.พ.สารojern หัตถกิจพานิชกุล  
 และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ

.....  
 นางสาวแจ่ม กระยะโภก  
 หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

.....  
 นายวิญญา จันทร์เนตร  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560  
 หน้า 1/9

**ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง**

ระดับความรุนแรง	รหัสสี (ใหม่)	รหัสสี (เดิม)	อาการ กลุ่มอาการ	รหัส คัดแยก
<b>危及生命 condition</b>  ภาวะเจ็บป่วยที่เป็นอันตราย ต่อชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที ( ระยะเวลา окอย 0 นาที )			ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ( cardiac arrest)	E1
			ผู้ป่วยหายใจ ( respiratory arrest)	E2
		แดงเข้ม	ผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบาก <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ เขียว</li> <li>➤ หายใจช้า &lt; 10 ครั้ง/นาที หรือ หายใจเร็วมากกว่า 35 ครั้ง/นาที</li> <li>➤ Sat O<sub>2</sub> &lt; 90</li> </ul>	E3
			ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะซึ่อก <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SBP &lt; 90 mm.Hg ในผู้ใหญ่</li> <li>➤ SBP &lt; 80 mm.Hg ในเด็กอายุ &gt; 5 ปี</li> </ul>	E4
			Glasgow coma score ≤ 8	E5
			ผู้ป่วยชาติบั้งอยู่ในภาวะชา หรือ ไม่รู้ตัว	E6
			Hypothermia BT < 35°	E7
			Hyperthermia BT > 40.5°	E8



โรงพยาบาลสิงสา

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน**  
**ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงสา**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

นพ.สารojน์ หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ

นางสาวแจ่ม กรกระโทก  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560  
หน้า 2/9

<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น(upper airway obstruction ) เช่น มี stridor หรือ drooling  ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการมีภาวะหายใจลำบาก ( severe respiratory distress ) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ หายใจเร็ว &gt; 30 ครั้ง/นาที</li> <li>➤ Sat O<sub>2</sub> &lt; 95</li> <li>➤ หายใจโดยใช้ accessory muscle หรือมี chest wall retraction</li> </ul> ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึ่อก <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ตัวลาย หรือ capillary refill &gt; 2 วินาที</li> <li>➤ ชีพจร &lt; 50 ครั้ง/นาที หรือ ชีพจร &gt; 150 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่</li> <li>➤ เสียงเลือดมาก(&gt; 750 cc)</li> </ul>	E9															
			E10															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยเจ็บหน้าอักด้วยสัญญาณจากโรคหัวใจ  ผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง( pain score > 7 ) ร่วมกับมี vital signs ผิดปกติ  ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E11															
		Glassglow coma score ≤ 13  ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ปากเบี้ยว หรือ พูดไม่ชัด  Hypothermia BT < 36°  Hyperthermia BT > 40° ในผู้ใหญ่ หรือ BT > 39° ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี	E12															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E13															
		Glassglow coma score ≤ 13  ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ปากเบี้ยว หรือ พูดไม่ชัด  Hypothermia BT < 36°  Hyperthermia BT > 40° ในผู้ใหญ่ หรือ BT > 39° ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี	E14															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E15															
		ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ปากเบี้ยว หรือ พูดไม่ชัด  Hypothermia BT < 36°  Hyperthermia BT > 40° ในผู้ใหญ่ หรือ BT > 39° ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี	E16															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E17															
		ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E18															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E19															
		ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E20															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E21															
		ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E22															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E23															
		ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลต่ำ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DTX &lt; 60 mg% หรือ DTX &gt;400 mg% ร่วมกับมีอาการ</li> </ul>	E24															
<b>ระดับ 2 Emergency</b>  <i>condition</i>  ภาวะเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (ระยะเวลาอ科อยไม่เกิน 15 นาที)	แดง  แดงอ่อน หรือเข้มขู	ผู้ป่วยเด็กให้พิจารณาตามตาราง กลุ่มที่ vital signs อยู่ใน danger zone จัดเป็น ระดับ 2 Danger zone vitals? <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">&lt; 3 m</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 180</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 60</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3 m - 1 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 160</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 yr - 5 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 140</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5-8 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 120</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">&gt;8 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt;110</td> <td style="padding: 5px;">&gt;22</td> </tr> </table>	< 3 m	> 180	> 60	3 m - 1 yr	> 160	> 50	1 yr - 5 yr	> 140	> 40	5-8 yr	> 120	> 30	>8 yr	>110	>22	E25
< 3 m	> 180	> 60																
3 m - 1 yr	> 160	> 50																
1 yr - 5 yr	> 140	> 40																
5-8 yr	> 120	> 30																
>8 yr	>110	>22																
ผู้ป่วยเด็กให้พิจารณาตามตาราง กลุ่มที่ vital signs อยู่ใน danger zone จัดเป็น ระดับ 2 Danger zone vitals? <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">&lt; 3 m</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 180</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 60</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3 m - 1 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 160</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 yr - 5 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 140</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5-8 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 120</td> <td style="padding: 5px;">&gt; 30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">&gt;8 yr</td> <td style="padding: 5px;">&gt;110</td> <td style="padding: 5px;">&gt;22</td> </tr> </table>	< 3 m	> 180	> 60	3 m - 1 yr	> 160	> 50	1 yr - 5 yr	> 140	> 40	5-8 yr	> 120	> 30	>8 yr	>110	>22			
< 3 m	> 180	> 60																
3 m - 1 yr	> 160	> 50																
1 yr - 5 yr	> 140	> 40																
5-8 yr	> 120	> 30																
>8 yr	>110	>22																



โรงพยาบาลสิงสา

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน  
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงสา**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

น.พ.สารojarn หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ

นางสาวแจ่ม กรกระโทก  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560

หน้า 3/9

			AGE	HR	RR	
			S at $O_2 < 95\%$ **	รพ.รามาธิบดี		
ระดับความรุนแรง	รหัสสี (ใหม่)	รหัสสี (เดิม)	อาการ กลุ่มอาการ			รหัส คัดแยก
ระดับ 3 <i>Urgency condition</i> ภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ อวัยวะ หากให้การช่วยเหลือล่าช้า (ระยะเวลาอุดหนู)  ไม่เกิน 30 นาที )	เหลือง	เหลือง	ความดันโลหิตสูง			
			➤ $SBP \geq 180 \text{ mm.Hg}$			
			➤ $DBP \geq 110 \text{ mm.Hg}$			
			➤ $BP \geq 160/90 \text{ mm.Hg}$ ร่วมกับมีอาการรบกวน			
			เสียเลือดปานกลาง ( $> 500 \text{ cc}$ )			
			ผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก หรือ หายใจติดขัด			
			ผู้ป่วยซัก ที่หยุดซักแล้ว และรู้ตัวดี			
			ไข้ ในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้นกันค่า เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง หรือ กินยากด ภูมิคุ้นกันหรือ ไข้ ร่วมกับมีอาการของ SIRS (sepsis)			
			ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีประวัติสลบ หรือ จำเป็นการณ์ไม่ได้ แต่ รู้ตัวดี			
			ปวดรุนแรงปานกลาง ( pain score $\geq 5$ ) ร่วมกับมี vital sign ผิดปกติ			
			ผู้ป่วยที่มีแขนขาพิครูป มีแพลงนาคใหญ่ หรือแพลงลูกทับ / กระแทกรุนแรง			
			ผู้ป่วยที่คลำซึ่งบรรบริเวณแขนขาไม่ได้ หรือมีอาการชาแขนขา			
			ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีประวัติอุบัติเหตุรุนแรงมาก			
			ผู้ป่วยตาอักเสบหรือติ่งแผลกล่องเข้าตาที่การมองเห็นปกติ			
			Open fx เข้าอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกรกรณี			

ระดับความรุนแรง	รหัสสี	รหัสสี	อาการ กลุ่มอาการ	รหัส
-----------------	--------	--------	------------------	------



โรงพยาบาลเสิงสาร

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน  
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาร**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

น.พ.สารojarn หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ

นางสาวแจ่ม กรกระโภก  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560  
หน้า 4/9

	(ใหม่)	(เดิม)		คัดแยก
ระดับ 4 <i>Semi-Urgency</i> <i>condition</i> ภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนทั่วไป (ระยะเวลาอقصาย ไม่เกิน 60 นาที )			เสียเลือดเล็กน้อย ( $< 500 \text{ cc}$ )	N1
			ผู้ป่วยที่กลืน หรือสำลักสิ่งแปลกปลอม โดยไม่มีอาการ หายใจติดขัด	N2
			บาดเจ็บทรวงอกที่ไม่มีอาการหายใจลำบาก หรือเจ็บ หน้าอก	N3
			ผู้ป่วยกลืนลำบากที่ไม่มีภาวะหายใจติดขัด	N4
			บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยโดยที่ไม่มีประวัติสลบ หรือ จำ เหตุการณ์ไม่ได้	N5
			ปวดรุนแรงปานกลาง ( $5 > \text{pain score} \geq 3$ )	N6
			ผู้ป่วยอาเจียน หรือถ่ายเหลวที่ไม่มีภาวะขาดน้ำ	N7
			บาดเจ็บแขนขาเล็กน้อย เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ สงสัย กระดูกซึ้นเดือดหัก หรือบาดแผลขนาดเล็ก	N8
			เพ้อกับจากการบวม โดยที่ไม่มีอาการของ compartment syndrome	N9
			ข้ออักเสบบวมแดง	N10
			ผู้ป่วยปวดห้องท้องที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่ประวัติไม่มี ความเสี่ยง (อายุ $< 65$ ปี หรือ $> 5$ ปี และไม่สังสัยสาเหตุที่ รุนแรง)	N11
			ผู้ป่วย jit เวชที่มีอาการเปลี่ยนแปลง แต่สามารถสังเกต อาการได้ และไม่เสี่ยงทำร้ายตัวเองและผู้อื่น	N12
ระดับ 5 <i>Non urgency</i>			ปวดเล็กน้อย ( $\text{pain score} < 3$ ) ประวัติเจ็บป่วยไม่รุนแรง	N13
			อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และไม่รุนแรงขึ้น หรือเป็นภาวะที่	N14



โรงพยาบาลเสิงสาง

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน**  
**ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

  
น.พ.สารojน์ หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ

นางสาวแจ่ม กรกระโทก  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560

หน้า 5/9

<i>condition</i> ภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน ( ระยะเวลาอคติอยู่ ไม่เกิน 120 นาที )	ขาว	เขียว	ไม่มีความเสี่ยง	
			ผู้ป่วยอุบัติเหตุ บาดแผลเล็กน้อย ไม่ต้องเย็บ	N15
			ผู้ป่วยนัด เช่น ทำแพล หรือ นีดวัคซีน	N16
			ผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยนานา และไม่มีพฤติกรรมรุนแรง	N17

หมายเหตุ

กรณีภาวะเจ็บป่วยที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้พิจารณาตามหลักการของ ESI V.4 ดังนี้



โรงพยาบาลสิริสา

วิธีปฏิบัติ  
เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน  
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิริสา

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

น.พ.สารojarn หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT


ผู้เห็นชอบ

นางสาวแจ่ม กรกระโภก  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560  
หน้า 6/9

**Figure 3-1. Emergency Severity Index Conceptual Algorithm, v. 4**





โรงพยาบาลสิงสา

**วิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน  
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงสา**

รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560

ฉบับแก้ไข : 02

ผู้จัดทำ

น.พ.สารojน์ หัตถกิจพานิชกุล  
และทีม PCT

ผู้เห็นชอบ


นางสาวแจ่ม กระรัตน์  
หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

ผู้อนุมัติ

นายวิญญา จันทร์เนตร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

วันที่บังคับใช้ 4 สิงหาคม 2560  
หน้า 7/9

Figure 3-1a. ESI Triage Algorithm



 โรงพยาบาลเสิงสาง	<b>วิธีปฏิบัติ</b> <b>เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน</b> <b>ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสิงสาง</b>	<b>รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560</b> <b>ฉบับแก้ไข : 02</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>  น.พ.สารojarn หัตถกิจพานิชกุล และทีม PCT	<b>ผู้เห็นชอบ</b>  นางสาวแจ่ม กระยะโภก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	<b>ผู้อนุมัติ</b>  นายวิญญา จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

### การคัดแยกและกำหนดคับบัตรคิวงานคัดแยกโรงพยาบาลเสิงสาง

กำหนดแนวทางคัดแยกผู้ป่วยเป็นระดับ ดังนี้

1. Resuscitation      บัตรคิวสีแดงสีแดง



ประเมินอาการและสัญญาณชีพ ถ้าพบว่า ต้อง Resuscitation ให้ส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันที

2. Emergency      บัตรคิวสีเขียว



ประเมินอาการ, สัญญาณชีพ, Neuro sign ,Oxygen sat, เอียงบันทึกในใบสีเขียว ส่งห้องฉุกเฉินทันที

3. Urgency      บัตรคิวสีเหลือง



ประเมินอาการ, สัญญาณชีพ, Neuro sign ,Oxygen sat,sprint ,stop bleeding เอียงบันทึกในใบสีเหลือง ส่งห้องฉุกเฉินทันที

4. Semi-Urgency      บัตรคิวสีเขียว




ให้คำแนะนำ / ช่วยผู้ป่วยด้วยความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชั่งน้ำหนัก จ่ายบัตรคิวตรวจและคิวห้องบัตรสีเขียว ให้ผู้ป่วยหรือญาติรอเรียกทำบัตรที่ห้องบัตรหมายเลข 5



○ ประวัติ สามเณร ชี พราหมณ์ นกบัว

ให้แบบฟอร์ม

 โรงพยาบาลเลิงสาง	<b>วิธีปฏิบัติ</b> <b>เรื่อง ตารางการคัดกรองผู้ป่วย งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและงาน</b> <b>ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลิงสาง</b>	<b>รหัสเอกสาร : WI-PCT-014/2560</b> <b>ฉบับแก้ไข : 02</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>  N.P. Sarorajn หัวหน้าศูนย์คุณภาพ และทีม PCT	<b>ผู้เห็นชอบ</b>  นางสาวแจ่ม กรกระโทก หัวหน้าศูนย์คุณภาพ	<b>ผู้อนุมัติ</b>  นายวิญญา จันทร์เนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล



ผู้สูงอายุ(อายุ60ปีขึ้นไป)

ให้แบบป้ายสัญลักษณ์



ผู้พิการ

ให้แบบป้ายสัญลักษณ์

ทำในรับรองแพทย์ไม่ต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้แบบป้ายสัญลักษณ์ “ใบรับรองแพทย์”

ผู้ป่วยนัดที่มาตรงวันนัด

ให้แบบป้ายสัญลักษณ์ “นัด”



ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ


ให้แบบป้ายสัญลักษณ์



ผู้ป่วยโคม่า

ให้แบบป้ายสัญลักษณ์

5. Non-Urgent      บัตรคิวสีขาว



ให้คำแนะนำ / ช่วยผู้ป่วยด้วยความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชั่งน้ำหนัก จ่ายบัตรคิวตรวจสอบและคิวห้องน้ำ ให้ผู้ป่วยหรือญาติรอเรียกทำบัตรที่ห้องบัตรหมายเลข 5